



مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با معنادرمانی بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان بیش فعال

آزاد سلمان نسب^۱، سجاد رئوف کاظمی^۲، هادی اسمخانی اکبری نژاد^۳

چکیده

سابقه و اهداف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با معنادرمانی بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان بیش فعال بود. **روش بررسی:** روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران کودکان بیش فعال شهر تبریز در سال ۱۴۰۱ به مراکز مشاوره خصوصی شهر تبریز مراجعه کرده بودند تشکیل دادند. ۴۵ نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند (هر گروه ۱۵ نفر). گروه های آزمایشی درمان مختص گروه خود را در ۸ جلسه ۱/۵ ساعته دریافت کردند. اما گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه های استرس ادراک شده کوهن (۱۹۸۴) و کیفیت زندگی (sf-36) (۱۹۸۴) بودند. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. **یافته ها:** در پیش آزمون، میانگین و انحراف معیار نمره استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در گروه های آزمایش و کنترل اختلاف معنی داری نداشت ($p > 0/05$). هر دو درمان در مقایسه با گروه، استرس ادراک شده و کیفیت زندگی مادران را در پس آزمون به ترتیب کاهش و افزایش دادند ($p < 0/001$). در مرحله پیگیری، اثر این دو درمان ماندگار بود ($p < 0/001$). تاثیر درمان ها بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در مراحل پس آزمون و پیگیری یکسان بود ($p > 0/05$). **بحث و نتیجه گیری:** به نظر می رسد این دو درمان می توانند با افزایش پذیرش شرایط زندگی و مواجهه آگاهانه با آن، به عنوان روشی موثر برای کاهش استرس ادراک شده و افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان بیش فعال مورد استفاده قرار گیرند.

واژه های کلیدی: شناخت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، معنادرمانی، استرس ادراک شده، کیفیت زندگی، مادران کودکان بیش فعال

^۱ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

^۲ کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی سراج، تبریز، ایران

^۳ دکتری تخصصی مشاوره، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی نی اکرم، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

(hadiakbarinejhad@yahoo.com)



مقدمه

اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی (attention deficit hyperactivity disorder) جزو اختلالات عصبی-تحوالی و از جمله شایع‌ترین اختلالات بهداشت روانی دوران کودکی است که تقریباً ۳ تا ۷ درصد کودکان سن مدرسه را دربر دارد. این کودکان نشانه‌هایی از جمله کمبود توجه، بیش‌فعالی و تکانشگری را از خود نشان می‌دهند. این نشانه‌ها غالباً در بسیاری از حوزه‌های زندگی فرد مانند عملکرد تحصیلی، روابط اجتماعی با همسالان و بزرگسالان ایجاد اختلال می‌کند (انجمن روان‌شناسی آمریکا^۱، ۲۰۱۳). برای این اختلال سه زیرگروه تعریف شده است که شامل نوع عمدتاً بی‌توجه، نوع عمدتاً تکانشگر و نوع مرکب است (کوگان و همکاران^۲، ۲۰۱۶). در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی-ویرایش پنجم (diagnostic and statistical manual of mental disorders)، اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی این‌گونه تعریف شده است: الگوی فقدان توجه یا بیش‌فعالی-تکانشگری پایدار که مانع کارکرد یا پیشرفت فرد می‌شود. در تعریفی دیگر بیش‌فعالی، اختلالی است که با تحریک‌پذیری مداوم، تکانشگری و مشکلاتی در تمرکز مشخص می‌شود (رابینسون و نیس^۳، ۲۰۱۵). در کنار شواهد زیستی در تبیین علت‌شناسی، عوامل خانوادگی و زمینه‌های محیطی نیز که به نوعی فرایند ابتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی را تسهیل می‌کنند مورد توجه است و در این میان، بافت خانوادگی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است (بایدرومن و فارانو^۴، ۲۰۰۲). وجود کودک دارای اختلال، مشکلات زیادی را برای والدین به همراه دارد. والدین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی به‌خصوص مادران به‌عنوان مراقبین اصلی کودک، اغلب به‌گونه‌ای زبان‌آور، سطح بالایی از فشار روانی را تجربه می‌کنند. احساس تقصیر و گناه، ناکامی، اضطراب و نگرانی، از جمله واکنش‌های شایع والدین در پی آگاهی از مشکل کودک است (آنکر^۵، ۲۰۲۰). مادران این کودکان فشارها، مشکلات روانی، افسردگی، محدودیت در روابط بین‌فردی و استرس ادراک شده (perceived stress) بالایی را در زندگی با این کودکان تجربه می‌کنند که می‌تواند بهداشت روانی آن‌ها را به مخاطره بیندازد و کیفیت زندگی (quality of life) خود را بسیار متفاوت از خانواده‌های عادی ارزیابی کنند (چنگ و تل^۶، ۲۰۱۶).

استرس ادراک شده فرایندی روانشناختی است که طی آن، فرد سلامت جسمی و روانی خود را تهدیدآمیز ادراک می‌کند (لی و همکاران^۷، ۲۰۱۹). استرس ادراک شده به ارزیابی افراد از شرایط پرتنش زندگی و این‌که آن‌ها چقدر این شرایط را قابل کنترل یا غیرقابل کنترل می‌دانند، اشاره دارد (برایان و همکاران^۸، ۲۰۱۷). استرس ذهنی زمانی ادراک می‌شود که موقعیت تهدیدآمیز تفسیرشده و بین مطالبات محیط بیرون و ادراک فرد از توانایی مقابله با آن‌ها ناهمخوانی وجود داشته باشد (اسکینر و همکاران^۹، ۲۰۲۰). مادران کودکان بیش‌فعال به دلیل احساس ناتوانی و بی‌کفایتی در ایفای نقش مادری و تربیت فرزند، استرس بالایی را تجربه می‌کنند و ممکن است به‌خاطر عدم کنترل رفتارهای تکانشی فرزندشان از روابط اجتماعی پرهیز کنند که این امر می‌تواند بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی این افراد را تحت‌تاثیر قرار دهد (آنکر، ۲۰۲۰).

بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی (world health organization) کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت‌هایشان است (مودال و همکاران^{۱۰}، ۲۰۲۱). بنابراین موضوعی کاملاً ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه‌های مختلف زندگی استوار است (دبلی و همکاران^{۱۱}، ۲۰۲۰). کیفیت زندگی، مفهوم وسیعی دارد که همه ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی را در بر می‌گیرد و حتی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، عاطفی و معنوی هم استفاده می‌شود و در واقع یک نیروی قدرتمند در راستای هدایت، حفظ و پیشبرد سلامت و تندرستی در جوامع و فرهنگ‌های مختلف است (علیرضایی و همکاران، ۱۴۰۰). کیفیت زندگی همچنین نوعی قضاوت شناختی در مورد شکاف بین واقعیت موجود فرد و موقعیت‌های زندگی ایده‌آل فرد است که رفتار عاطفی مثبت یا منفی را در وی

^۱ · APA

^۲ · Coogan et al

^۳ · Robinson & Neece

^۴ · Biederman & Faraone

^۵ · Anker

^۶ · Cheung & Theule

^۷ · Lee et al

^۸ · Bryan et al

^۹ · Schneider et al

^{۱۰} · Mundal et al

^{۱۱} · Daly et al



برمی‌انگیزد و دیدگاه کلی فرد در مورد میزان رضایتی که از زندگی احساس می‌کند را شامل می‌شود (پرز فلورز و همکاران^{۱۲}، ۲۰۲۰). از آنجا که مادران کودکان بیش‌فعال بیشترین ارتباط را با فرزندشان دارند و بیش از سایر اعضای خانواده درگیر چالش‌ها و مشکلات این کودکان می‌شوند ممکن است فشار و استرس بیشتر و کیفیت زندگی پایین‌تری را گزارش کنند که در صورت عدم توجه و دریافت مداخلات مناسب می‌تواند سلامت روانی، روابط بین‌فردی و زناشویی این مادران را دچار بحران کند (ویتنی و اسمیت^۱، ۲۰۱۵). با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در خصوص مشکلاتی که این مادران با آن مواجه هستند، اقدام مداخله‌گرایانه، حمایت اجتماعی و سایر برنامه‌های حمایتی برای ارتقای بهداشت روانی مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی، بیش‌از پیش ضرورت پیدا می‌کند (نصیرنژاد و اکبری نژاد، ۱۴۰۰). مداخلات روانشناختی متعددی برای کاهش این مشکلات در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ((mindfulness based cognitive therapy (MBCT)) و معنادرمانی (logo therapy) اشاره کرد.

شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی به‌عنوان یکی از درمان‌های موج سوم شناختی- رفتاری شناخته می‌شود. این رویکرد توسط Teasdale و همکارانش در سال ۱۹۹۲ مطرح شده است و یک مداخله کوتاه‌مدت و ساختاریافته است که برگرفته از مدل کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی ساخته شده توسط Kabat-Zinn است و اصول درمان شناختی به آن اضافه شده است (کینگستون و همکاران^۲، ۲۰۱۵). آموزش ذهن‌آگاهی به معنای توجه کردن هدفمند به لحظه حاضر بدون آگاهی قضاوت‌مندان در مورد تجارب در حال وقوع درونی و بیرونی می‌باشد (تووت و همکاران^۳، ۲۰۱۴). در این روش تاکید بر پذیرش افکار، احساسات و حالات بدنی و تجارب لحظه‌به‌لحظه فرد بوده است و برخلاف درمان شناختی- رفتاری، تغییر دادن افکار بیمار مد نظر نمی‌باشد. در این رویکرد فرض بر این است که فرد به واسطه پذیرفتن افکار و احساسات خود و عدم قضاوت در مورد آن‌ها به بهبودی می‌رسد. این رویکرد به ما یاری می‌دهد تا این نکته را درک کنیم که هیجان‌های منفی ممکن است رخ دهند، اما آن‌ها جزء ثابت و دائمی شخصیت نیستند، همچنین به فرد این امکان را می‌دهد تا به‌جای آن که به رویدادها به‌طور غیرارادی و بی‌تامل پاسخ دهد با تفکر و تامل پاسخ دهد (رودریگز و همکاران^۴، ۲۰۱۹). درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی نه‌تنها باعث کاهش اختلالات روانی می‌شود، بلکه باعث می‌شود افراد در برابر استرس‌های آینده، پاسخ سازگارانه‌تری بدهند (نیلا و همکاران^۵، ۲۰۱۶). پژوهش‌ها حاکی از این است که این درمان بر کاهش تنیدگی والدینی، نشخوارهای فکری و نگرش‌های ناکارآمد (شکری و همکاران، ۱۳۹۹)، ابر کاهش تنیدگی، افسردگی و اضطراب والدین، بر ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و مادران کودکان بیش‌فعال، بر کاهش افسردگی و استرس ادراک‌شده مادران باردار و استرس ادراک‌شده مادران کودکان با نیازهای ویژه موثر است (شافر و همکاران^۶، ۲۰۲۰).

معنادرمانی امروزه یکی از رویکردهای مطرح روانشناسی در جهان است که توسط Frankel بنا نهاده شد و بر پایه‌ی مفاهیم اساسی از قبیل آزادی، مسئولیت‌پذیری، ارزش‌ها و جستجوی معنا قرار دارد. براساس این رویکرد، ناراحتی زمان ما عبارتست از بی‌معنایی، یا خلاء وجودی که غالباً وقتی تجربه می‌شود که مردم خودشان را با امور عادی یا کار مشغول نمی‌سازند. فرآیند درمانی زمانی به نتیجه می‌رسد که فرد با رنج‌بردن، کار و عشق، چالش ایجاد نماید (شفیع آبادی و ناصری، ۱۴۰۲). فرانکل کوشید که انسان‌ها معنای زندگی خویش را دریابند و از رخوت و خلاء وجودی، بیرون آمده و آن سرچشمه‌های زلال زندگی را ادراک کنند و زندگی را پوچ و باطل ندانند. بنابراین باید هدف یا معنایی در زندگی وجود داشته باشد. این هدف یا معنا به‌گونه‌ای است که حتی بغرنج‌ترین لحظات زندگی را نیز معنادار می‌کند. مرگ، رنج و بلاهای طبیعی همه با وجود معنا در زندگی قابل تحمل می‌شوند (پروچسکا و توراکس، ۱۹۹۹). معنای زندگی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی است. توجه به ادراکات افراد درباره عوامل شخصی زندگی آنها نقش مهمی را در کیفیت زندگی آنها ایفا می‌کند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد افرادی که معنای زندگی بالاتر و پذیرش خود بیشتری دارند، رضایت بیشتر از زندگی، مسئولیت‌پذیری بیشتر و خودکنترلی بالاتری دارند که همگی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی می‌باشد (خورانی و همکاران، ۱۳۹۹). پژوهش‌ها نشان دادند که معنادرمانی در کاهش استرس ادراک‌شده مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه تاثیر داشته است (چوپانی و عزیزی، ۱۴۰۰). همچنین معنادرمانی موجب

^{۱۲} Pérez-Flores et al

^۱ Whitney & Smith

^۲ Kingston et al

^۳ Tovote et al

^۴ Rodrigues et al

^۵ Nila et al

^۶ Shaffer et al



افزایش معنای زندگی، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده مادران کودکان مبتلا به اوتیسم و افزایش مهارت‌های ارتباطی و کاهش استرس ادراک‌شده مادران کودکان کم‌توان ذهنی، بر بهزیستی روانشناختی زنان بیوه شده است (آکتانا و اکشیب^۱، ۲۰۲۲). اهمیت نقش مادران در سلامت خانواده و فرزندان به‌خصوص کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش‌فعالی ضرورت پژوهش‌های بیشتری در این زمینه را ایجاب می‌کند. چالش‌ها و مشکلاتی که مادران این کودکان با آن روبه‌رو هستند می‌تواند بر تمامی جنبه‌های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و سلامت جسمانی و روانی این افراد تاثیرگذار باشد، زیرا این مادران بیشترین زمان را با کودکان خود سپری می‌کنند و علاوه بر مشکلاتی که در مدیریت رفتار فرزندشان دارند، در برقراری ارتباط با اطرافیان نیز دچار نگرانی و استرس هستند که این شرایط می‌تواند کیفیت زندگی آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی، بر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی مادران کودکان بیش‌فعال موثر باشد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا ضمن بررسی اثربخشی این دو درمان بر متغیرهای پژوهش، مشخص شود که کدام‌یک از این درمان‌ها بر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی مادران کودکان بیش‌فعال اثربخشی بیشتری دارد. در خصوص مقایسه اثربخشی این دو درمان پژوهشی صورت‌نگرفته تا بتوانیم تناقضات موجود را بررسی کنیم. از این‌رو هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی بر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان بیش‌فعال است.

مواد و روش‌ها

روش پژوهش حاضر، نیمه‌تجربی و طرح آن از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای فرزند بیش‌فعال بود که در سال ۱۴۰۱ به مراکز مشاوره و روانشناسی خصوصی شهر تبریز مراجعه کرده بودند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس مبتنی بر هدف استفاده شد. پس از کسب رضایت از مادران، پرسشنامه‌های استرس ادراک‌شده کوهن و کیفیت‌زندگی (sf-36) در بین ۱۷۱ نفر که مایل به شرکت در پژوهش بودند توزیع شد (توضیح این‌که پرسشنامه‌ها توسط آزمودنی‌ها و در حضور پژوهش‌گران پر شدند) که ۱۴۱ نفر در پرسشنامه استرس ادراک‌شده و کیفیت‌زندگی یک انحراف معیار بالاتر و پایین از میانگین نمره کسب کردند. از این بین، ۴۵ نفر با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود (سن ۲۵ تا ۴۵ سال، متاهل بودن، میزان تحصیلات (دیپلم تا لیسانس)، تعداد فرزند (۱ تا ۳ فرزند) و ملاک‌های خروج از مطالعه (ابتلا به بیماری خاص و مزمن نظیر فلج، کم‌شنوایی، دیابت، ام‌اس و ...، استفاده از داروهای روان‌پزشکی مخصوص اختلالات روان‌شناختی حاد و شرکت همزمان با پژوهش حاضر در جلسات درمان مشاوره و روان‌درمانی فردی و گروهی و غیبت بیش از دو جلسه در جلسات درمانی) انتخاب، و به‌صورت تصادفی (به شیوه قرعه‌کشی) به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) تقسیم شدند. با بهره‌گیری از نرم‌افزار G پاور (۰/۵)، اندازه اثر: ۰/۱۵) و حجم نمونه مطالعات نیمه‌آزمایشی گذشته، حجم نمونه مطالعه حاضر ۴۵ نفر (۱۵ نفر برای هر گروه) تعیین شد. توضیح این‌که حجم نمونه بزرگ‌تر از ۱۵ نفر در روان‌درمانی‌های گروهی ممکن است کیفیت درمان و پویایی گروه‌های درمانی را پایین بیاورد. شایان ذکر است که همه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت‌کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. اطلاعات آن‌ها محرمانه نگه داشته شدند و در پایان درمان، گروه کنترل نیز تحت مداخله قرار گرفتند. برای برگزاری جلسات درمانی از افراد هیچ هزینه‌ای دریافت نشد. کد اخلاق پژوهش حاضر IR.IAU.TABRIZ.REC.1401.223 بود.

اطلاعات جمعیت‌شناختی از نمونه‌ها جمع‌آوری شد، شامل سن، میزان تحصیلات و تعداد فرزند بود.

مقیاس استرس ادراک‌شده کوهن: مقیاس استرس ادراک در سال ۱۹۸۳ توسط Cohen و همکاران طراحی شد و افکار و احساسات دربارهٔ حوادث استرس‌زا را مورد سنجش قرار می‌داد. این مقیاس دارای ۱۴ سوال است که براساس طیف ۵ درجه‌ای لیکرت (هیچ (۰)، کم (۱)، متوسط (۲)، زیاد (۳) و خیلی زیاد (۴)) نمره‌گذاری شده است. در این مقیاس ماده‌های ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۳ به‌صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شود. دامنهٔ نمرات در این مقیاس از صفر تا ۵۶ بود که نمره بالاتر نشان‌دهنده استرس ادراک‌شده بیشتر بود. سازندگان ابزار روایی مقیاس را تأیید کرده و ضریب پایایی مقیاس را بالای ۰/۷۰ عنوان کرده‌اند (کوهن و همکاران^۱، ۱۹۸۳). در ایران روایی محتوی این ابزار توسط ده تن از اساتید علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن بالای ۰/۷۰ گزارش شد (سعادت و همکاران، ۱۳۹۴). در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ۰/۷۳ محاسبه شده است.

^۱ Aktana & Eksjib

^۱ Cohen et al



مقیاس کیفیت زندگی (sf-36): این پرسشنامه توسط Ferance & Powers در سال ۱۹۸۴ ساخته شده است و شامل ۳۶ سوال با پاسخ‌های چندگزینه‌ای (ضعیف (۱) تا عالی (۵)) است و دیدگاه فرد را نسبت به سلامتی شخصی می‌سنجد. حداقل نمره در این پرسشنامه ۳۶ و حداکثر ۱۸۰ است. نمره بالاتر نشان دهنده کیفیت زندگی بیشتر است. این پرسشنامه دارای ابعاد هشت‌گانه عملکرد جنسی، محدودیت جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی، سلامت روانی و نشاط است. ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسط سازندگان این مقیاس برای کل پرسشنامه و هر یک از ابعاد گفته شده به ترتیب ۰/۹۰، ۰/۸۵، ۰/۷۱، ۰/۶۵، ۰/۷۷، ۰/۸۴، ۰/۸۱، ۰/۷۷ و ۰/۸۳ گزارش شد که نشانگر ثبات درونی خوب این ابعاد و کل پرسشنامه است. همچنین در ایران رفیعی و همکاران (۱۳۹۳) روایی همگرایی نسخه فارسی این پرسشنامه را برای کل پرسشنامه و ابعاد آن به ترتیب ۰/۸۱، ۰/۸۳، ۰/۸۱، ۰/۷۶، ۰/۶۶، ۰/۷۹، ۰/۸۰، ۰/۸۳ و ۰/۷۹ گزارش کرده‌اند. در پژوهش حاضر پایایی کل این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ۰/۷۸ محاسبه شده است پس از اجرای پیش‌آزمون، اعضای گروه آزمایش اول، طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای (۲ ماه؛ هفته‌ای یک جلسه) شناخت‌درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی را به صورت گروهی طبق برنامه Williams, Segal و Teasdale (۲۰۱۳) دریافت کردند (جدول ۱). اعضای گروه آزمایش دوم نیز طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای (۲ ماه؛ هفته‌ای یک جلسه) معنادرمانی را به صورت گروهی طبق برنامه درمانی Andron (۲۰۰۷) دریافت کردند (جدول ۲). اما اعضای گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. جلسات درمانی در یک مرکز مشاوره خصوصی در شهر تبریز توسط یک متخصص مشاوره با درجه دکتری، یک کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و یک کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برگزار شد. برای جلوگیری از تبادل اطلاعات بین اعضای گروه‌های آزمایش، از آن‌ها خواسته شد تا چهار ماه پس از اتمام درمان، درباره محتوای جلسات با یکدیگر گفتگویی نداشته باشند. بعد از اتمام جلسات (پس‌آزمون) و چهار ماه پس از اتمام درمان (پیگیری)، اعضای هر سه گروه با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری ارزیابی شدند.

جدول ۱. جلسات شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی طبق برنامه درمانی Segal و همکاران (۲۰۱۳)

جلسه	شرح جلسات
اول	هدف: آگاهی بیشتر از احساسات، افکار و حس‌های بدنی لحظه به لحظه و تجربه بودن در لحظه. موضوع: توضیح درباره اهمیت حضور در لحظه حال و بودن در این‌جا و اکنون، و بازکردن مفهوم ذهن‌آگاهی برای اعضا با استفاده از چند فن، و یاد گرفتن انجام امور روزمره، همراه با توجه کردن به آن‌ها.
دوم	هدف: توجه به احساسات و افکار، و گسترش و پذیرش افکار و احساسات ناخوشایند. موضوع: پی‌بردن به ذهن سرگردان و تمرین توجه به بدن، احساس جسمی و فیزیکی و توجه به تنفس.
سوم	هدف: مهارت‌های پاسخ‌گویی به فکر یا احساس ناخوشایند. موضوع: آرام گرفتن ذهن سرگردان با تمرین تنفس و مرور بدن، مراقبه نشسته و انجام تمرین‌هایی که توجه را به لحظه حال می‌آورند.
چهارم	هدف: جلوگیری از ایجاد تثبیت افکار منفی. موضوع: یاد گرفتن این‌که بدون فرار و دوری کردن از افراد، در لحظه اکنون باقی بمانیم و تلاطم افکار را نظاره کنیم.
پنجم	هدف: تغییر عادات قدیمی فکر کردن مانند شناخت امور روزمره خودکار، بی‌انگیزه بودن در کارها، بی‌نتیجه دانستن فعالیت‌ها، فرار یا اجتناب از موقعیت‌های سخت زندگی، آرزوهای بزرگ داشتن، مقایسه همیشگی وضع موجود خود با وضعیت دل‌خواه. موضوع: آگاهی کامل از افکار و احساسات و پذیرفتن آن‌ها بدون قضاوت و دخالت مستقیم.
ششم	هدف: آگاه شدن از علایم هشداردهنده بهزیستی روان‌شناختی. موضوع: تغییر خلق و افکار از طریق تلقی افکار به‌عنوان فقط فکر و نه واقعیت.
هفتم و هشتم	هدف: آگاهی از تغییرات جزئی خلق. موضوع: هشبار بودن از نشانه‌های کاهش بهزیستی روان‌شناختی، و تنظیم برنامه برای روبه‌رو شدن احتمالی با نشانه‌های کاهش بهزیستی روان‌شناختی؛ برنامه‌ریزی برای آینده و استفاده از فنون حضور در لحظه برای ادامه زندگی و تعمیم آن‌ها به کل جریان زندگی.

جدول ۲. جلسات معنادرمانی طبق برنامه درمانی Andron (۲۰۰۷)

جلسه	محتوا
اول	آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و مشاور و فرایند مشاوره
دوم	آشنایی با رویکرد معنا درمانی



سوم	پذیرش مسئولیت فرد نسبت به خود و دیگران
چهارم	یافتن هدف در زندگی
پنجم	بررسی موضوع مرگ و زندگی
ششم	غلبه بر یاس و ناامیدی
هفتم	نگرش و احساسات افراد در زندگی
هشتم	خلاصه و پایان جلسات گروهی و اجرای پس آزمون

جهت جلوگیری از ریزش اعضای گروه‌ها، حین مصاحبه اولیه با تک‌تک آن‌ها از اعضا خواسته شد تعهد خود را نسبت به شرکت در کل جلسات حفظ کنند. این امر در طول جلسات نیز رصد می‌شد و همبستگی گروهی که بین اعضا ایجاد شده بود، مانع ریزش افراد گروه گردید.

فرضیه پژوهش: اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی بر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان بیش‌فعال متفاوت است.

متغیرهای مستقل: شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی

متغیر وابسته: استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی

برای تجزیه و تحلیل آماری از نسخه ۲۴ نرم افزار SPSS استفاده شد. جهت بررسی فرضیه پژوهش از آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی، و برای مقایسه سن از آنالیز واریانس و برای مقایسه میزان تحصیلات و تعداد فرزندان‌شان از آزمون خی‌دو استفاده شد. در این پژوهش سطح معنی‌داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در جدول ۳، یافته‌های توصیفی متغیرهای سن، میزان تحصیلات و تعداد فرزند آزمودنی‌ها آورده شده است. در جدول ۳، سطوح معناداری به‌دست آمده نشان می‌دهند که بین سه گروه از نظر سن، میزان تحصیلات و تعداد فرزند تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ($P > 0/05$). در بررسی پیش‌فرض‌های آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر، آزمون Kolmogorov-Smirnov نشان داد که پیش‌فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه در نمونه مورد بررسی محقق شده است؛ زیرا مقادیر Z محاسبه شده در سطح ($P > 0/05$) معنی‌دار نیستند. در آزمون ام‌باکس، از آنجایی که F متغیرهای استرس ادراک‌شده ($2/211$) و کیفیت زندگی ($5/521$) به ترتیب در سطح $0/269$ و $0/431$ معنادار نبودند، می‌توان گفت که مفروضه‌های همسانی ماتریس کوواریانس برای متغیرها برقرار شده است. همچنین نتایج آزمون لوین برای بررسی برابری واریانس خطا در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری نشان داد که با توجه به عدم معنی‌داری مقدار F متغیرها در سطح خطای کوچکتر از ($0/05$) می‌توان گفت که واریانس خطای متغیر پژوهش در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری باهم برابر بوده و از این جهت فرض همسانی واریانس‌های خطا نیز برقرار است. در آخر آزمون کرویت موخلی نشان دادند با توجه به این که مقدار کرویت موخلی ($0/340$) متغیر استرس ادراک‌شده در سطح خطای داده شده ($0/509$) و مقدار کرویت موخلی ($0/142$) متغیر کیفیت زندگی در سطح خطای داده شده ($0/473$) معنی‌دار نیست، می‌توان کرویت ماتریس واریانس - کوواریانس متغیرهای وابسته را پذیرفت؛ بنابراین، این پیش‌فرض نیز برقرار است.

جدول ۳. یافته‌های توصیفی سن، میزان تحصیلات و تعداد فرزند آزمودنی‌ها به تفکیک گروه‌ها

گروه‌ها



متغیر	ذهن‌آگاهی (N=۱۵)			معنادرمانی (N=۱۵)		کنترل (N=۱۵)	آماره	سطح معنی-داری
	انحراف معیار ± میانگین	انحراف معیار ± میانگین	انحراف معیار ± میانگین	انحراف معیار ± میانگین	انحراف معیار ± میانگین			
تحصیلات	سن	۴۰/۴۰ ± ۰/۰۴۳	۳۹/۰۷ ± ۴/۰۴۴	۴۰/۳۳ ± ۴/۲۲۰	F=۰/۵۸۵	۰/۵۶۲		
	دیپلم	۸ (۵۳/۴)	۸ (۵۳/۴)	۶ (۴۰)				
	فوق‌دیپلم	۴ (۲۶/۷)	۴ (۲۶/۷)	۷ (۴۶/۷)				
تعداد فرزند	لیسانس	۳ (۲۰)	۳ (۲۰)	۲ (۱۳/۳)				
	۱	۸ (۵۳/۴)	۶ (۴۰)	۶ (۴۰)				
	۲	۶ (۴۰)	۷ (۴۶/۷)	۶ (۴۰)				
	۳	۱ (۶/۶)	۲ (۱۳/۳)	۳ (۲۰)				

نتایج جدول ۴ نشان می‌دهد که بین نمرات متغیر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی در سه بار اجرای پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد ($P < 0/001$). همچنین نتایج حاکی از این هستند که نمرات استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی در گروه‌های آزمایش در پس‌آزمون و پیگیری نسبت به پیش‌آزمون تفاوت معنی‌داری دارد ($P < 0/001$). علاوه بر این تاثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی بر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان بیش‌فعال پس از چهار ماه پیگیری ماندگار بوده است ($P < 0/001$). نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان می‌دهند که اختلاف میانگین نمره استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی در گروه‌های درمانی با گروه کنترل معنادار می‌باشد ($P < 0/001$).

نتایج مقایسه‌های زوجی برای مرحله پیگیری نیز نشان از آن دارند که اختلاف میانگین نمرات استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی در گروه‌های درمانی با گروه کنترل معنادار می‌باشد ($P < 0/001$). از سوی دیگر نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی از آن هستند که معنی‌داری تغییرات بین گروهی به دلیل تفاوت تغییرات گروه‌های درمانی با گروه کنترل است؛ به طوری که هم در پس‌آزمون و هم در پیگیری، نمرات استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی گروه‌های درمانی به ترتیب کمتر و بیشتر از نمرات گروه کنترل است. اما نمره استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی متفاوت از یکدیگر نمی‌باشد؛ بنابراین، شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی بر کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش کیفیت زندگی، نسبت به یکدیگر برتری ندارند.

با توجه به این که آزمون اثر پیلای در موقعیت‌های عملی دارای قدرت بیشتری نسبت به سایر آزمون‌ها می‌باشد، نتایج آن در جدول ۵ گزارش شده است. اطلاعات بخش اول جدول ۵ در مورد متغیر استرس ادراک‌شده بیان می‌کند که بین نمرات این متغیر در سه بار اجرای پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بخش دوم نتایج این جدول حاکی از آن هستند که بین نمرات متغیر استرس ادراک‌شده در سه بار اجرای پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری در گروه‌های آزمایش (شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی) و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ به عبارت دیگر بین زمان و مداخله تعامل وجود دارد. اندازه اثر به‌دست آمده برای متغیر استرس ادراک‌شده (۰/۳۵۵) نشان می‌دهد که ۳۵ درصد از تغییرات متغیر استرس ادراک‌شده مربوط به اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی بوده است. علاوه بر این اطلاعات بخش اول جدول ۵ برای متغیر کیفیت زندگی بیان می‌کند که بین نمرات این متغیر در سه بار اجرای پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بخش دوم نتایج این جدول



نشان می‌دهد که بین نمرات متغیر کیفیت زندگی در سه بار اجرای پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری در گروه‌های آزمایش (شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی) و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ به عبارت دیگر بین زمان و مداخله تعامل وجود دارد. اندازه اثر به‌دست آمده برای متغیر کیفیت زندگی (۰/۲۴۵) نشان می‌دهد که ۲۴ درصد از تغییرات متغیر کیفیت زندگی مربوط به اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی بوده است.

برای بررسی این مهم که نمرات کدام‌یک از گروه‌ها در متغیر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی در مرحله پس‌آزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوت دارند، مقایسه زوجی انجام شد (جدول ۶). نتایج نشان دادند که اختلاف میانگین نمرات استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی گروه‌های آزمایش با گروه کنترل معنی‌دار بود ($P < 0/001$)؛ اما اختلاف میانگین نمرات استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی در گروه‌های آزمایش نسبت به یکدیگر معنی‌دار نبود ($P > 0/05$). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نیز حاکی از آن هستند که معنی‌داری تغییرات بین گروهی ناشی از تفاوت تغییرات گروه شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی با کنترل است. به‌طوری که هم در پیش‌آزمون و هم در پیگیری، نمرات استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی گروه‌های آزمایشی به ترتیب کمتر و بیشتر از نمره گروه کنترل می‌باشند؛ اما نمرات استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی گروه‌های درمانی، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛ بنابراین برتری درمان در پس‌آزمون و پیگیری در کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش کیفیت زندگی به نفع هیچ‌یک از درمان‌ها نیست.

جدول ۴. نمرات متغیرهای استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی پژوهش در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری

متغیر	گروه	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پیگیری	سطح معنی‌داری	سطح معنی‌داری - تغییرات بین گروهی
		انحراف معیار \pm میانگین	انحراف معیار \pm میانگین	انحراف معیار \pm میانگین	تغییرات داخلی گروهی	تغییرات بین گروهی
استرس ادراک‌شده	شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی	۲۶/۴۰ \pm ۳/۴۳۹	۲۲/۶۷ \pm ۳/۶۱۹	۲۲/۶۷ \pm ۳/۶۱۹	$P < 0/001$	$P < 0/001$
	معنادرمانی	۲۶/۰۰ \pm ۳/۴۴۹	۲۱/۸۰ \pm ۳/۳۰۵	۲۱/۸۷ \pm ۳/۲۹۵	$P < 0/001$	$P < 0/001$
	کنترل	۲۶/۹۳ \pm ۳/۷۸۸	۲۷/۰۷ \pm ۳/۶۹۳	۲۷/۰۷ \pm ۳/۶۹۳	$P > 0/038$	
کیفیت زندگی	شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی	۳۹/۵۳ \pm ۴/۳۰۷	۴۵/۷۴ \pm ۶/۱۷۴	۴۵/۴۰ \pm ۶/۱۷۴	$P < 0/001$	$P < 0/001$
	معنادرمانی	۴۰/۰۰ \pm ۴/۹۵۷	۴۵/۶۰ \pm ۵/۷۱۷	۴۵/۵۳ \pm ۵/۶۳۰	$P < 0/001$	$P < 0/001$
	کنترل	۳۹/۸۷ \pm ۳/۵۰۲	۴۰/۰۷ \pm ۳/۴۷۴	۴۰/۲۷ \pm ۳/۳۶۹	$P > 0/954$	

جدول ۵. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره در نمرات متغیرهای پژوهش در گروه‌های آزمایش و کنترل

متغیر	تأثیر	مقدار	F	فرضیه درجه آزادی	خطای درجه آزادی	سطح معنی‌داری	اندازه اثر
استرس ادراک‌شده	زمان	۰/۷۹۱	۷۷/۷۳۷	۲/۰۰۰	۴۱/۰۰۰	۰/۰۰۱	۰/۷۹۱
	زمان*مداخله	۰/۷۱۰	۱۱/۵۴۹	۴/۰۰۰	۸۴/۰۰۰	۰/۰۰۱	۰/۳۵۵



کیفیت زندگی	زمان	اثر پیلایی	۰/۶۸۶	۴۴/۸۳۱	۲/۰۰۰	۴۱/۰۰۰	۰/۰۰۱	۰/۶۸۶
زمان*مداخله	اثر پیلایی	۰/۴۹۰	۶/۸۱۳	۴/۰۰۰	۸۴/۰۰۰	۰/۰۰۱	۰/۲۴۵	

جدول ۶. مقایسه زوجی برای متغیرهای پژوهش براساس آزمون تعقیبی بونفرونی

متغیر وابسته	گروه ۱	گروه ۲	مجموع تفاوت‌ها	انحراف استانداردها	سطح معنی‌داری
استرس ادراک‌شده (پیش‌آزمون)	شناخت‌درمانی	معنادرمانی	۰/۴۰۰	۱/۱۹۶	۱/۰۰۰
		کنترل	-۰/۵۳۳	۱/۱۹۶	۱/۰۰۰
استرس ادراک‌شده (پیش‌آزمون)	معنادرمانی	کنترل	-۰/۹۳۳	۱/۱۹۶	۱/۰۰۰
استرس ادراک‌شده (پس‌آزمون)	شناخت‌درمانی	معنادرمانی	۰/۸۶۷	۱/۱۹۳	۱/۰۰۰
		کنترل	-۴/۴۰۰	۱/۱۹۳	۰/۰۰۲
استرس ادراک‌شده (پس‌آزمون)	معنادرمانی	کنترل	-۵/۲۶۷	۱/۱۹۳	۰/۰۰۱
استرس ادراک‌شده (پیگیری)	شناخت‌درمانی	معنادرمانی	۰/۸۰۰	۱/۱۹۳	۱/۰۰۰
		کنترل	-۴/۴۰۰	۱/۱۹۳	۰/۰۰۲
استرس ادراک‌شده (پیگیری)	معنادرمانی	کنترل	-۵/۲۰۰	۱/۱۹۳	۰/۰۰۱
کیفیت زندگی (پیش‌آزمون)	شناخت‌درمانی	معنادرمانی	-۰/۴۶۷	۱/۵۶۹	۱/۰۰۰
		کنترل	-۰/۳۳۳	۱/۵۶۹	۱/۰۰۰
کیفیت زندگی (پیش‌آزمون)	معنادرمانی	کنترل	۰/۱۳۳	۱/۵۶۹	۱/۰۰۰
کیفیت زندگی (پس‌آزمون)	شناخت‌درمانی	معنادرمانی	-۰/۱۳۳	۱/۹۱۹	۱/۰۰۰
		کنترل	۵/۴۰۰	۱/۹۱۹	۰/۰۲۲
کیفیت زندگی (پس‌آزمون)	معنادرمانی	کنترل	۵/۵۳۳	۱/۹۱۹	۰/۰۱۹
کیفیت زندگی (پیگیری)	شناخت‌درمانی	معنادرمانی	-۰/۱۳۳	۱/۸۹۹	۱/۰۰۰
		کنترل	۵/۱۳۳	۱/۸۹۹	۰/۰۳۰
کیفیت زندگی (پیگیری)	معنادرمانی	کنترل	۵/۲۶۷	۱/۸۹۹	۰/۰۲۵

بحث و نتیجه‌گیری

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با معنادرمانی بر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان بیش‌فعال بود. تحلیل داده‌ها نشان داد که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی بر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی مادران کودکان بیش‌فعال تاثیر دارند. همچنین، یافته‌ها نشان داد که تاثیر این دو درمان بر کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان بیش‌فعال در پس‌آزمون و پیگیری با هم متفاوت نیست. تطابق نتایج پژوهش حاضر با پژوهش‌های مشابه که از لحاظ موضوعی با این پژوهش تطابق داشته باشند به دلیل در دسترس نبودن مقایسه اثربخشی دو درمان بر استرس ادراک‌شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودکان بیش‌فعال مقدور نبود، ولی می‌توان گفت نتایج حاصل از این پژوهش با یافته‌های مطالعات زیر هم‌سو می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که در هیچ پژوهشی نتایج مغایر با نتایج پژوهش حاضر به دست نیامده تا دلیل ناهم‌سویی را مورد بحث قرار دهیم.



در راستای اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی مادران کودکان بیش‌فعال می‌توان به نتایج پژوهش‌های شگری و همکاران (۱۳۹۹)، چاپلین^۱ و همکاران (۲۰۲۱)، اقدسی و همکاران (۱۳۹۸) و هوشیار و همکاران (۱۳۹۷)، عجم و همکاران (۱۳۹۸)، لوینرگ^۲ و همکاران (۲۰۲۰) شافر و همکاران (۲۰۲۰) اشاره کرد. شگری و همکاران (۱۳۹۹) در پژوهش خود نشان دادند که ذهن‌آگاهی از طریق فنونی مانند توجه به تنفس و بدن و معطوف کردن آگاهی به این‌جا و اکنون، بر نظام شناختی و پردازش اطلاعات فرد تأثیر گذاشته و باعث کاهش تنیدگی و استرس ادراک‌شده والدین می‌شود. همچنین نتایج پژوهش عجم و همکاران (۱۳۹۸)، نشان داد که اجرای برنامه آموزشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی منجر به افزایش معنادار کیفیت زندگی مادران کودکان بیش‌فعال شده است.

شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی نوعی شیوه خاص پرورش توجه برای توسعه آگاهی است. ذهن‌آگاهی شامل توانمند شدن در شناسایی جنبه‌های مشکل‌آفرین یک فکر و برقراری رابطه‌ای با رویکرد متفاوت با این افکار است. هدف هر دوره درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی آموزش شیوه‌های متفاوت برقراری ارتباط با محتواهای ذهنی است (رایان و احمد^۳، ۲۰۱۸). نگرانی در مورد رفتار کودکان و نوجوانان و نحوه کنار آمدن با آن که منشأ تنش یا فشار روانی والدین است و به تبع آن احساس افسردگی و فقدان شایستگی که مبین احساس بی‌لیاقتی و ناتوانی در انجام وظایف والدینی اسیت، بیشترین تأثیر را بر استرس ادراک‌شده والدین دارد (شگری و همکاران، ۱۳۹۹). ذهن‌آگاهی از طریق سازوکارهایی مانند رویارویی، پذیرش، آرام سازی، حساسیت‌زدایی، تغییر روابط با افکار و تنظیم هیجان باعث کاهش استرس می‌شود. با توجه به محتوای جلسه‌های کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی، تأکید بر به‌کارگیری روش‌هایی برای کاهش استرس و هوشیار بودن نسبت به وضعیت خود می‌باشد. رها کردن مبارزه و پذیرش خود بدون قضاوت، مفهوم اصلی و اساسی در درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی می‌باشد. در واقع، پذیرش بدون قضاوت با سلامت روان رابطه دارد (ون ویتمارسچن^۴، ۲۰۱۸). به‌علاوه ذهن‌آگاهی از طریق پذیرش و تجربه هیجانات، ایجاد خودآگاهی و اجتناب از الگوی تفکر خودکار می‌تواند به‌عنوان آموزش در راستای توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی این مادران به کار گرفته شود (نازیکی و همکاران، ۱۴۰۱). درباره اثربخشی معنادرمانی می‌توان به نتایج مطالعات چوپانی و عزیز (۱۴۰۰)، فلاح زاده و همکاران (۱۳۹۷)، سرهنگ و همکاران (۱۴۰۱) و آکتانا و اکشپ (۲۰۲۲) اشاره کرد. چوپانی و عزیز (۱۴۰۰) در پژوهشی نشان دادند معنادرمانی در کاهش میزان استرس ادراک‌شده در مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه تأثیر داشته است. همچنین پژوهش فلاح زاده و همکاران (۱۳۹۷) حاکی از این است که معنادرمانی موجب بهبود کیفیت زندگی و عملکرد مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم می‌شود.

یکی از اصول اساسی معنادرمانی این است که توجه انسان‌ها را به این مسئله سوق می‌دهد که انگیزه و هدف زندگی خود را به جای اجتناب از درد و کسب لذت، کشف معنا قرار دهند. معنادار بودن، به اشخاص اجازه می‌دهد رویدادها را تفسیر کنند و درباره چگونگی گذراندن زندگی و خواسته‌های خود در زندگی ارزش‌هایی در نظر بگیرند. در حقیقت یکی از کارکردهای معنایی آن است که انسان را از احساس پوچی و سردرگمی نجات دهد و به آرامش یافتن انسان کمک کند و در نتیجه سبب سلامت روان در فرد شود (سرهنگی و همکاران، ۱۴۰۱). مادران کودکان با نیازهای ویژه با چالش‌های بسیاری روبرو هستند که آن‌ها را در معرض پیامدهای روانی منفی چون استرس قرار داده و سلامت روانی آنان را تضعیف می‌کند. معنادرمانی با ایجاد احساسی قوی از معنا و هدف در زندگی این مادران، سازگاری روانشناختی آن‌ها را تسهیل کرده و تأثیر افکار مزاحم بر سلامت روان را کاهش می‌دهد. به این خاطر که در این مداخله، تکنیک‌ها، منابع، راه‌های دریافت معنا و نیز استخراج علاقه‌مندی‌ها، اهداف و اولویت‌ها در زندگی آموزش داده می‌شود، نگرش متفاوتی نسبت به حوادث پراسترس ایجاد می‌شود و فرد رویدادهای منفی را به صورت احتمالات مثبت، مجدداً چارچوب‌بندی می‌کند (فلاح زاده و همکاران، ۱۳۹۷). در کل معنادرمانی به افراد کمک می‌کند، درک جدیدتر و عمیق‌تری نسبت به زندگی و شرایط آن به دست آورند و ترغیب شوند امیدوارتر به زندگی ادامه دهند و به راحتی در مقابل اتفاقات زندگی تسلیم نشوند که این امر به کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش کیفیت زندگی کمک می‌کند (سرهنگ و همکاران، ۱۴۰۱).

^۱ - Chaplin

^۲ - Lönnberg

^۳ - Rayan & Ahmad

^۴ - van Wietmarschen



نمونه پژوهش حاضر را مادران ۲۵ تا ۴۵ ساله دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی شهر تبریز تشکیل دادند که این مورد یکی از محدودیت‌های پژوهش حاضر است. و تعمیم‌یافتن به مادران کودکان بیش‌فعال جوان‌تر و مسن‌تر و سایر شهرها را دشوار می‌سازد. همچنین، در این پژوهش جمع‌آوری داده‌ها توسط پرسشنامه انجام شد که به دلیل خودگزارشی بودن ابزارها، سوگیری در پاسخ‌دهی محتمل است. پیشنهاد می‌شود پژوهش حاضر در جوامع آماری مختلف و در سایر شهرها اجرا گردد و از سایر روش‌های گردآوری اطلاعات نظیر مشاهده و مصاحبه نیز استفاده شود.

با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و معنادرمانی، با کاربرد فنون و روش‌های خاص خود، سبب کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش کیفیت زندگی مادران دارای فرزند بیش‌فعال شده است. با توجه به نقش مهم مادران در خانواده و جامعه و از طرفی، لزوم توجه به سلامت جسمانی و روانشناختی آن‌ها پیشنهاد می‌شود در کیلینیک‌های روانشناسی، سازمان بهزیستی و مراکز دولتی و خصوصی مشاوره، از این درمان‌ها به صورت فردی و گروهی در زمینه کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش کیفیت زندگی مادران دارای فرزند بیش‌فعال استفاده شود.

منابع

- اقدسی، نسیم، سلیمانیان، علی اکبر؛ گندمانی، رقیه. (۱۳۹۸). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر طرحواره‌های هیجانی مادران کودکان فلج مغزی. *آرشیو توانبخشی*؛ دوره ۲۰، شماره ۱.
- پروچسکا، جیمز. ا. و نوراکس، جان. سی. (۱۹۹۹). نظریه‌های روان‌درمانی، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۹۹، چاپ یازدهم، تهران، نشر رشد.
- تازیکی، طیبیه؛ مومنی، خدامراد؛ کرمی جهانگیر؛ افروز، غلام علی. (۱۴۰۱). تأثیر مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی. *مجله روان‌شناسی افراد استثنایی*، ۱۲(۴۵): ۱-۲۶.
- چوپانی، مریم و عزیزی، زهرا. (۱۴۰۰). بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش استرس ادراک‌شده و افزایش سلامت روان در مادران دارای فرزند استثنایی، نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران.
- خورانی، جواد؛ احمدی، وحید؛ مامی، شهرام؛ ولی زاده، رضا. (۱۳۹۹). تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی، رضایت از زندگی، انعطاف‌پذیری شناختی و افکار خودکشی در افراد مبتلا به افسردگی؛ (۱۰): ۱۱۲-۱۱۲.
- رفیعی، نرگس؛ شریفیان، ثانی مریم؛ رفیعی، حسن؛ بهنام پور، ناصر؛ فروزش، کیان. (۱۳۹۳). ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص کیفیت زندگی. *مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران*؛ ۲۴ (۱۱۶): ۷۵-۸۳.
- سرهنگی، معصومه؛ حسینی نسب، سیدداوود؛ پناه علی، امیر. (۱۴۰۱). اثربخشی آموزش معنادرمانی بر بهزیستی روان‌شناختی، مهارت‌های ارتباطی و استرس والدگری مادران کودکان کم‌توان ذهنی. *فصل‌نامه خانواده‌درمانی کاربردی*، ۳(۱۲): ۳۸۸-۴۱۷.
- سعادت، سجاد؛ اصغری، فرهاد؛ جزایری، رضوان السادات. (۱۳۹۴). رابطه خودکارآمدی تحصیلی با استرس ادراک‌شده، راهبردهای مقابله‌ای و حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده در دانشجویان دانشگاه گیلان. *مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی*، ۱۵ (۱۲): ۶۷-۷۸.
- شریفیان، قاضی جهانی؛ مریم، اکبرپور، مرتضی و اسمخانی اکبری نژاد، هادی. (۱۳۹۹). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با معنادرمانی بر کیفیت زندگی و نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به بیماری ایدز. *سلامت جامعه*، ۱۴(۲): ۹-۱۹.
- شفیع آبادی، عیدالله؛ ناصری، غلامرضا. (۱۴۰۲). نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی. تهران: مرکز انتشارات دانشگاهی.
- شکری، افسانه؛ کاظمی، رضا؛ نریمانی، محمد؛ تکلوی، سمیه. (۱۳۹۹). مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و آموزش تنظیم شناختی هیجان بر تئیدگی والدینی مادران کودکان پرخاشگر. *فصل‌نامه سلامت روان کودک*، ۷(۱): ۲۰۵-۲۱۹.
- عجم، صمد؛ محمدی یوسف‌نژاد، سیدیونس و آقاجان بگلو، سوسن. (۱۳۹۸). اثربخشی شناخت‌درمانی گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی (ADHD) جزیره قشم، پنجمین همایش ملی تازه‌های روان‌شناسی مثبت‌نگر، بندرعباس.
- علیرضایی مقدم بجستانی، سمیه؛ حاتمی، محمد؛ اکبری، الهام؛ چپانی، فریبا؛ رستمی، امیر مسعود. (۱۴۰۰). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با کیفیت زندگی همسران جانبازان. *فصل‌نامه روان‌شناسی نظامی*، ۱۲ (۴۸): ۷۵-۹۴.
- فلاح زاده، هاجر؛ نوری، سارا؛ پور ابراهیم، تقی؛ نظربلند، ندا. (۱۳۹۷). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم. *خانواده پژوهی*، ۱۴(۱): ۱۳۵-۱۴۹.

- نصیرنژاد، علی؛ اسمخانی اکبری نژاد، هادی. (۱۴۰۰). اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری مثبت بر استرس ادراک شده و شادکامی مادران کودکان بیش فعال. *تحولات جدید در روانشناسی، علوم تربیتی و تعلیم و تربیت*; ۴:۲۷۱-۸۲.
- هو شیار، مع صومه؛ کاکاوند، علی رضا؛ احمدی، عبدالجواد. (۱۳۹۷). اثربخشی ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی و سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم. *فصل‌نامه مددکاری اجتماعی*، ۷(۲): ۳۲-۳۹.
- Aktana Z, Ekşib H.(2022). The effect of the logotherapy-based group psychological counseling program on widowed syrian refugee women's well-being. *TRCJHA*;1: 31-48.
- American Psychiatric Association DS, American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5*.(2013). Washington, DC: American psychiatric association; May 22.
- Anderson, A.(2007). Logo therapy and spirituality/ a course in Victor Frankel Logo therapy. Available at [http://www .Worshapers.org.uk/](http://www.Worshapers.org.uk/). Retrieved 8/3/2007
- Anker E, Haavik J, Heir T.(2020). Alcohol and drug use disorders in adult attention deficit/ hyperactivity disorder: prevalence and associations with attention-deficit/hyperactivity disorder symptom severity and emotional dysregulation. *World J Psychiatry*; 9:202.
- Biederman J, Faraone SV, Monuteaux MC.(2002). Differential effect of environmental adversity by gender: Rutter's index of adversity in a group of boys and girls with and without ADHD. *Am J Psychiatry*; 9:1556-62.
- Bryan AE, Kim HJ, Fredriksen-Goldsen KI.(2017). Factors associated with high-risk alcohol consumption among LGB older adults: The roles of gender, social support, perceived stress, discrimination, and stigma. *The Gerontologist*; 57:S95-104
- Chaplin TM, Turpyn CC, Fischer S, Martelli AM, Ross CE, Leichtweis RN, Miller AB, Sinha R.(2021). Parenting-focused mindfulness intervention reduces stress and improves parenting in highly stressed mothers of adolescents. *Mindfulness*; 12:450-62.
- Cheung K, Theule J.(2016). Parental psychopathology in families of children with ADHD: A meta-analysis. *J Child Fam Stud.*; 25:3451-61.
- Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R.(1983). A global measure of perceived stress. *JSTOR*; 1:385-96.
- Coogan AN, Baird AL, Popa-Wagner A, Thome J.(2016). Circadian rhythms and attention deficit hyperactivity disorder: The what, the when and the why. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 67:74-81.
- Daly LE, Dolan RD, Power DG, Ní Bhuachalla É, Sim W, Cushen SJ, Fallon M, Simmons C, McMillan DC, Laird BJ, Ryan AM.(2020). Determinants of quality of life in patients with incurable cancer. *Cancer*. Jun 15;12:2872-82.
- Kingston T, Collier S, Hevey D, McCormick MM, Besani C, Cooney J, O'Dwyer AM.(2015). Mindfulness-based cognitive therapy for psycho-oncology patients: an exploratory study. *Ir J Psychol Med*; 3:265-74.
- Lee A, Lee KS, Park H.(2019). Association of the use of a heated tobacco product with perceived stress, physical activity, and internet use in Korean adolescents: A 2018 national survey. *Int J Environ Res Public Health*; 6:965.
- Lönnerberg G, Jonas W, Unternaehrer E, Bränström R, Nissen E, Niemi M.(2020). Effects of a mindfulness based childbirth and parenting program on pregnant women's perceived stress and risk of perinatal depression—Results from a randomized controlled trial. *J Affect Disord*; 262:133-42.
- Mundal I, Laake P, Mezzich J, Bjørkly SK, Lara-Cabrera ML.(2021). Assessment of the quality of life in parents of children with ADHD: Validation of the multicultural quality of life index in norwegian pediatric mental health settings. *Front Psychol*; 12:638006.
- Nila K, Holt DV, Ditzen B, Aguilar-Raab C.(2016). Mindfulness-based stress reduction (MBSR) enhances distress tolerance and resilience through changes in mindfulness. *Ment Health Prev*; 1: 36-41.
- Pérez-Flores J, Hernández-Torres A, Montón F, Nieto A.(2015). Health-related quality of life and depressive symptoms in Friedreich ataxia. *Qual Life Res*. 2020; 29:413-20.
- Rayan A, Ahmad M.(2018). Mindfulness and parenting distress among parents of children with disabilities: A literature review. *Perspect Psychiatr Care*; 2:324-30
- Robinson M, Neece CL.(2015). Marital satisfaction, parental stress, and child behavior problems among parents of young children with developmental delays. *J Ment Health Res Intellect Disabil*; 1:23-46.
- Rodrigues MF, Campos C, Pelucio L, Barreto I, Machado S, Appolinario JC, Nardi AE, Levitan M.(2019). Patients' comprehension of mindfulness-based cognitive behavioral therapy in an outpatient clinic for resistant depression: a cross-sectional study. *Front Psychol*; 10:271.
- Schneider EE, Schönfelder S, Domke-Wolf M, Wessa M.(2020). Measuring stress in clinical and nonclinical subjects using a German adaptation of the Perceived Stress Scale. *Int J Clin Health Psychol*; 2:173-81.



- Segal ZV, Williams JM, Teasdale JD.(2013). Mindfulness Based cognitive therapy for depression. 3rd Ed. New York: The Guilford Press: 86.
- Shaffer EJ, Lape JE, Salls J.(2020). Decreasing stress for parents of special needs children through a web-based mindfulness program: A pilot study. Internet J Allied Health Sci Pract; 4:16.
- Tovote KA, Fleeer J, Snippe E, Peeters AC, Emmelkamp PM, Sanderman R, Links TP, Schroevers MJ.(2014). Individual mindfulness-based cognitive therapy and cognitive behavior therapy for treating depressive symptoms in patients with diabetes: results of a randomized controlled trial. Diabetes care; 9:2427-34.
- van Wietmarschen H, Tjaden B, van Vliet M, Battjes-Fries M, Jong M.(2018). Effects of mindfulness training on perceived stress, self-compassion, and self-reflection of primary care physicians: a mixed-methods study. BJGP open; 4: 1.
- Whitney RV, Smith G. Emotional disclosure through journal writing: Telehealth intervention for maternal stress and mother-child relationships. Rev J Autism Dev Disord; 11: 3735-3745.



Comparing the Effectiveness of Cognitive Therapy based on Mindfulness with Logo Therapy on Perceived Stress and Quality of Life of Mothers with Hyperactive Children

Azad Salmannasab^۱, Sajjad Raoufkazmi^۲, Hadi Smkhani Akbarinejad^{۳*}

ABSTRACT

Background: The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness with logo therapy on perceived stress and quality of life of mothers with hyperactive children.

Research method: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the research was made up of all the mothers of hyperactive children in Tabriz city who referred to private counseling centers in Tabriz city in 1401. 45 people were selected and randomly divided into three groups using the purposeful sampling method (15 people in each group). The experimental groups received treatment specific to their group in 8 sessions of 1.5 hours. But the control group did not receive treatment. The measuring tools were Cohen's perceived stress (1984) and quality of life (sf-36) (1984) questionnaires. The data were analyzed by analysis of variance with repeated measures and Bonferroni's post hoc test. **Findings:** In the pre-test, there was no significant difference between the mean and standard deviation of perceived stress score and quality of life in the experimental and control groups ($p>0.05$). Both treatments decreased and increased mothers' perceived stress and quality of life in the post-test, respectively ($p<0.001$) compared to the group. In the follow-up phase, the effect of these two treatments was permanent ($p<0.001$). The effects of treatments on perceived stress and quality of life were the same in the post-test and follow-up phases ($p>0.05$). **Discussion:** It seems that these two treatments can be used as an effective way to reduce perceived stress and increase the quality of life of mothers of hyperactive children by increasing the acceptance of life conditions and consciously facing them.

Keywords: Cognitive Therapy Based On Mindfulness, Logo Therapy, Perceived Stress, Quality Of Life, Mothers Of Hyperactive Children.

^۱Master's degree in General Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

^۲Master's degree in Educational Psychology, University Seraj, Tabriz, Iran

^۳Ph.D in Counseling Psychology, Department of Psychology, University College of Nabi Akram, Tabriz, Iran (Corresponding Author)